



#Rosp2021 #VieConventionnelle #rémunération #médecins

## **La Rémunération sur objectifs de santé publique en 2021**

L'année 2021 a vu une grande majorité d'indicateurs s'orienter à la hausse traduisant un investissement renforcé des médecins libéraux sur les objectifs de santé publique.

### ✓ **2021 : une reprise positive des indicateurs pour la ROSP médecin traitant de l'adulte**

Concernant la ROSP du médecin traitant de l'adulte, après la forte baisse observée l'an passé due à la pandémie, l'indicateur de dosages d'HbA1c chez les patients diabétiques progresse significativement (+2,0 points). Les deux autres indicateurs relatifs au diabète restent stables (légère baisse du dépistage de la maladie rénale chronique avec -0,3 point).

L'indicateur de dépistage de la maladie rénale chronique chez les patients hypertendus s'améliore (+0,8 point) : 36% des médecins dépassent l'objectif cible.

Concernant les indicateurs de prévention, après la forte hausse des indicateurs grippe l'an passé avec la pandémie, les deux indicateurs sont en baisse mais restent à un niveau supérieur à celui observé avant la pandémie, 61,2% des 65 ans et plus se sont vaccinés (56,4% en 2019 et 64,2% en 2020) et 37,0% des patients à risque (34,9% en 2019 et 40,9% en 2020).

La prévention du cancer colorectal est très bien orientée après le ralentissement observé l'an passé (+3,8 points) soit 453 000 patients mieux traités. La prévention du cancer du sein et du cancer du col s'améliore légèrement (respectivement +0,3 et +0,2 point).

S'agissant des indicateurs d'efficience, la prescription dans le répertoire d'antihypertenseurs progresse de 1,3 point, soit 2 108 000 boîtes prescrites en plus dans le répertoire par rapport au hors répertoire et la prescription dans le répertoire de statines et autres traitements conserve un niveau élevé (62% des médecins se situent au-dessus de l'objectif cible) malgré une baisse de 1,8 point cette année.

La progression de la prescription de biosimilaires se poursuit pour s'établir à 32,6% de boîtes prescrites (+5,8 points). Les indicateurs décroissants sur les inhibiteurs de la pompe à protons et l'ézétimibe sont quant à eux mal orientés, respectivement +1,8 et +1,9 point.

**Le montant moyen de rémunération de la ROSP médecin traitant de l'adulte reste stable et s'élève à 4 891 euros par médecin pour les médecins généralistes et MEP** (contre 4 909 en 2020 et 4820 euros en 2019) **rattrapant ainsi le montant moyen d'avant crise**<sup>1</sup>.

**Au global 64 801 médecins sont rémunérés pour un montant total de 263,9 millions d'euros** (contre 267,4 millions pour 65 680 médecins rémunérés en 2021). La légère baisse de la rémunération globale par rapport à l'an dernier s'explique par la diminution du nombre de médecins éligibles liée à l'augmentation du nombre de médecins en cessation d'activité.

### ✓ **ROSP des cardiologues**

Les indicateurs de la ROSP des cardiologues sont en majorité bien orientés pour cette année. En effet, la rémunération moyenne s'élève à 2 016 euros en moyenne pour 4 414 cardiologues soit 8,9 millions d'euros (contre 2 093 euros en moyenne pour 4 412 médecins rémunérés et 9,2 millions

<sup>1</sup> Pour rappel, la situation très atypique de l'année 2020 ayant perturbé le calcul de la ROSP, des mesures d'ajustement avaient été définies avec les représentants des médecins.

versés au total l'an passé).

#### ✓ **ROSP des gastro-entérologues**

Les indicateurs de la ROSP des gastro-entérologues sont tous bien orientés en 2021. Cette hausse des indicateurs permet de retrouver un niveau de rémunération globale versée de 2,8 millions d'euros pour 1 995 médecins (soit 1 391 euros en moyenne), proche du montant versé en 2019 à 2,9 millions d'euros.

#### ✓ **ROSP des endocrinologues**

Les résultats des indicateurs de la ROSP endocrinologues sont mitigés. On note une forte hausse de l'indicateur relatif aux soins de podologie (+4,9 points). A l'inverse, l'indicateur portant sur l'autonomisation de la mise sous insuline des personnes diabétiques de moins de 80 ans est en baisse de 1,9 point.

La rémunération ROSP des endocrinologues pour 2021 est en hausse (+4%), soit 1,1 million d'euros versé pour 786 médecins, soit 1 438 euros en moyenne.

#### ✓ **ROSP du médecin traitant de l'enfant**

Pour 2021, les pédiatres affichent de meilleurs résultats que les PS libéraux sur l'ensemble des indicateurs, à l'exception de celui relatif au traitement par corticoïdes inhalés ou antileucotriennes où ils sont équivalents. Pour 2021, le montant total versé s'élève à 12,7 millions d'euros (+9,5%), la rémunération moyenne s'élève à 1 020 euros pour les pédiatres.

***Résultats complets nationaux des ROSP en annexe de ce communiqué***

#### **A propos de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam)**

Établissement public national à caractère administratif, sous la double tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé (chargé de la Sécurité sociale) et du ministère de l'Action et des Comptes publics, la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam) gère, au niveau national, les branches Maladie et Accidents du travail / Maladies professionnelles du régime général de Sécurité sociale.

Avec plus de 2 200 salariés, elle constitue la tête de pont opérationnelle du régime d'assurance maladie obligatoire en France.

Elle pilote, coordonne, conseille et appuie l'action des organismes locaux qui composent son réseau (CPAM, DRSM, Ugecam, Carsat, CGSS...). Elle mène les négociations avec les professionnels de santé au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam). Elle concourt ainsi, par les actions de gestion du risque ou les services en santé qu'elle met en œuvre, à l'efficacité du système de soins et au respect de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam). Elle participe également à la déclinaison des politiques publiques en matière de prévention et informe chaque année ses assurés pour les aider à devenir acteurs de leur santé.

#### **Contact presse**

[presse.cnam@assurance-maladie.fr](mailto:presse.cnam@assurance-maladie.fr)



[Suivez notre actualité sur Twitter !](#)

## Annexes - Résultats complets nationaux

### Indicateurs cliniques pour les médecins traitants (libéraux)

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Evol. en points 2020 - 2021
<b>PREVENTION</b>	<b>Grippe</b>							
	Vaccination antigrippale des 65 ans et plus	52,9%	52,9%	55,3%	56,4%	64,2%	61,2%	-3,0
	Vaccination antigrippale du sujet à risque	31,2%	31,2%	33,3%	34,9%	40,9%	37,0%	-3,9
	<b>Dépistage des cancers</b>							
	Dépistage du cancer du sein	67,3%	66,1%	66,4%	66,2%	63,2%	63,4%	0,2
	Dépistage du cancer du col ****	56,9%	56,8%	56,1%	55,0%	53,4%	53,7%	0,3
	Dépistage du cancer colorectal ***	22,9%	29,1%	28,1%	30,8%	30,5%	34,3%	3,8
	<b>iatrogénie médicamenteuse</b>							
	Patient âgé sous psychotropes	5,3%	5,0%	4,8%	4,6%	4,5%	4,4%	-0,1
	Traitement par benzodiazépine hypnotique	41,6%	40,9%	42,4%	41,0%	42,9%	43,7%	0,8
	Traitement par benzodiazépine anxiolytique	15,1%	15,0%	14,8%	14,3%	15,0%	15,2%	0,2
	<b>Antibiothérapie</b>							
Antibiothérapie des 16-65 ans sans ALD	39,5	36,1	35,8	32,9	24,3	23,3	-0,9	
Antibiorésistance	43,2%	39,5%	36,9%	34,7%	34,7%	34,4%	-0,3	
<b>SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES</b>	<b>Diabète</b>							
	Nombre de dosages HbA1c chez le diabétique ***	79,0%	78,7%	79,4%	79,7%	76,9%	78,9%	2,0
	Fond d'œil chez le diabétique **	62,9%	62,0%	65,8%	68,1%	67,0%	67,0%	0,1
	Dépistage maladie rénale chronique chez le diabétique **	31,0%	34,9%	40,9%	43,4%	42,5%	42,2%	-0,3
	<b>HTA</b>							
	Dépistage maladie rénale chronique chez l'hypertendu **	7,0%	9,0%	22,3%	24,8%	24,6%	25,4%	0,8
	<b>Risque cardio-vasculaire</b>							
	Prévention secondaire du risque cardio-vasculaire	44,2%	43,6%	43,7%	43,9%	44,1%	44,9%	0,8
Surveillance d'un traitement par anti vitamine K **	79,0%	80,2%	85,5%	84,1%	80,4%	79,8%	-0,6	
<b>OPTIMISATION ET EFFICACITE DES PRESCRIPTIONS</b>	<b>Prescription dans le répertoire (ou bio-similaires)</b>							
	Statine dans le répertoire des génériques	90,3%	90,7%	98,1%	97,0%	95,4%	93,5%	-1,8
	Antihypertenseur dans le répertoire des génériques	86,5%	88,5%	92,7%	95,3%	93,3%	94,7%	1,3
	Traitement de l'incontinence urinaire dans le répertoire des génériques	47,1%	Indicateurs neutralisés					
	Traitement de l'asthme dans le répertoire des génériques	78,9%						
	Autres traitements dans le répertoire des génériques *	47,1%	62,2%	62,3%	64,7%	61,0%	59,8%	-1,1
	Biosimilaires de l'insuline glargine ***	0,2%	2,8%	9,1%	19,7%	26,8%	32,6%	5,8
	<b>Efficacité des prescriptions</b>							
	Traitement par inhibiteurs de la pompe à protons			30,9%	30,1%	30,8%	32,6%	1,8
	Traitement par ézétimibe			11,0%	12,0%	13,5%	15,4%	1,9
Traitement antiagrégant plaquettaire par aspirine	87,2%	87,9%	88,4%	88,9%	89,2%	89,7%	0,5	
Traitement par metformine chez le diabétique de type 2	80,6%	81,4%	82,3%	83,0%	83,6%	83,6%	0,0	
Hormonémies thyroïdiennes *	86,7%	89,1%	90,7%	91,0%	91,1%	91,0%	-0,2	

\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2017

\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2018

\*\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2019

\*\*\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2020

## Indicateurs cliniques pour les médecins traitants de l'enfant (libéraux)

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Evol. en points 2020 - 2021
PREVENTION	<b>Vaccination</b>							
	2 doses vaccin ROR chez enfants de - 2 ans	75,7%	78,1%	83,1%	84,3%	85,9%	87,0%	1,1
	1 dose vaccin antiméningocoque C enfants - 18 mois	75,3%	80,5%	89,2%	95,1%	97,4%	98,0%	0,6
	<b>Antibiorésistance</b>							
	Part des C3 ou C4 des enfants de - 4 ans traités par antibiotiques	34,0%	27,0%	24,1%	21,3%	20,1%	20,5%	0,4
	Part des C3 ou C4 des enfants de + 4 ans traités par antibiotiques	22,8%	19,3%	17,2%	15,2%	14,1%	14,6%	0,4
SUIVI PATHO. CHRONIQUES	<b>Suivi bucco-dentaire</b>							
	Examen bucco-dentaire chez les - 16 ans	76,5%	76,9%	76,9%	77,4%	71,9%	74,1%	2,2
	<b>Asthme</b>							
S	Asthme persistant [1-16 ans] traités par CI ou ALT	54,8%	54,1%	53,0%	53,9%	55,5%	50,9%	-4,6
	Asthme persistant [6-16 ans] avec au moins 1 EFR/an	38,4%	39,8%	43,3%	43,2%	41,3%	42,8%	1,5

Décroissants

## Indicateurs cliniques pour les cardiologues

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Evol. en points 2020 - 2021
PREVENTION	<b>HTA</b>							
	Hypertension artérielle sous trithérapie	68,1%	68,3%	68,5%	69,6%	70,6%	70,9%	0,3
	Surveillance biologique sous trithérapie anti-HTA	89,4%	90,0%	90,4%	91,4%	91,2%	92,2%	1,0
	<b>Iatrogénie</b>							
SUIVI PATHO. CHRONIQUE	Limiter la durée des traitements antiagrégants	67,9%	66,6%	65,1%	63,3%	61,3%	61,1%	-0,2
	<b>Infarctus du myocarde</b>							
	Traitement post infarctus du myocarde	34,2%	33,5%	32,2%	32,0%	32,4%	32,4%	0,0
EFF. PRESCRIPTIONS	<b>Insuffisance cardiaque</b>							
	Traitement de l'insuffisance cardiaque	63,4%	63,4%	64,1%	65,8%	66,5%	67,3%	0,8
	<b>Prescription dans le répertoire</b>							
EFF. PRESCRIPTIONS	Antihypertenseurs génériques	86,1%	90,9%	93,3%	92,6%	91,8%	92,6%	0,8
	Statines génériques	91,2%	95,0%	93,8%	89,9%	84,7%	80,0%	-4,7

Dec

## Indicateurs cliniques pour les gastro-entérologues

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Evol. en points 2020 - 2021
PREVENTION	<b>Dépistage du cancer colorectal</b>							
	Coloscopie totale avec polypectomie	3,1%	3,7%	3,6%	3,6%	3,5%	3,2%	-0,3
	<b>Eradication Helicobacter Pylori</b>							
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Contrôle d'éradication d'Helicobacter Pylori	58,9%	61,3%	63,1%	63,5%	57,1%	64,1%	6,9
	<b>Cancer colorectal</b>							
	Imagerie après intervention pour cancer colorectal	73,5%	74,9%	77,3%	79,1%	78,7%	80,5%	1,8
	ACE après intervention pour cancer colorectal	27,4%	27,2%	27,2%	28,0%	27,9%	28,8%	0,9
	<b>MICI</b>							
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Protéinurie pour MICI sous 5-ASA	38,4%	38,8%	39,7%	41,0%	39,9%	41,9%	2,0
	NFS-plaquettes pour MICI sous azathioprine	71,2%	70,7%	70,2%	70,8%	67,2%	69,6%	2,3

Dec

## Indicateurs cliniques pour les endocrinologues

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Evol. en points 2020 - 2021
PREVENTION	<b>Diabète</b>						
	Soins de podologie chez le diabétique	51,0%	51,9%	52,9%	50,0%	55,0%	4,9
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	<b>Diabète</b>						
	Diabétiques de moins de 70 ans traités par insulinothérapie « basal bolus »	88,6%	85,6%	79,6%	89,2%	88,1%	-1,0
	<b>Thyroïde</b>						
	Dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline	69,5%	70,3%	72,3%	71,2%	71,6%	0,4
	Cytoponction avant opération d'un nodule thyroïdien	48,4%	50,0%	54,5%	57,9%	56,9%	-1,0
EFF. PRESCRIPTI ONS	<b>Diabète</b>						
	Autonomisation du diabétique de moins de 80 ans en initiation par l'insuline	69,5%	70,6%	70,4%	69,0%	67,1%	-1,9
	Initiation par l'insuline à l'hôpital chez le diabétique de moins de 80 ans	26,0%	23,9%	22,9%	20,8%	20,5%	-0,3

Dec.

## Indicateurs cliniques pour les médecins traitants adultes (centres de santé)

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Résultats à fin déc. 2021	Evol. en points 2020 - 2021
PREVENTION	<b>Grippe</b>							
	Vaccination antigrippale des 65 ans et plus	40,1%	40,2%	42,3%	43,9%	50,1%	49,4%	-0,7
	Vaccination antigrippale du sujet à risque	26,4%	26,7%	29,2%	31,3%	36,1%	33,2%	-2,9
	<b>Dépistage des cancers</b>							
	Dépistage du cancer du sein	61,1%	59,9%	59,9%	60,2%	57,8%	58,3%	0,4
	Dépistage du cancer du col ****	50,2%	49,8%	48,9%	47,8%	46,1%	45,7%	-0,4
	Dépistage du cancer colorectal ***	17,1%	23,7%	23,7%	24,5%	24,9%	28,8%	3,9
	<b>Iatrogénie médicamenteuse</b>							
	Patient âgé sous psychotropes	3,0%	2,9%	2,9%	2,7%	2,7%	2,8%	0,1
	Traitement par benzodiazépine hypnotique	39,7%	39,1%	41,9%	41,4%	43,4%	43,9%	0,5
	Traitement par benzodiazépine anxiolytique	13,1%	13,8%	14,0%	13,7%	14,7%	15,4%	0,7
	<b>Antibiothérapie</b>							
Antibiothérapie des 16-65 ans sans ALD	26,7	24,2	23,6	21,6	15,4	14,2	-1,2	
Antibiorésistance	37,6%	36,7%	35,4%	34,2%	33,4%	32,7%	-0,8	
SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES	<b>Diabète</b>							
	Nombre de dosages HbA1c chez le diabétique ***	71,1%	71,2%	72,4%	73,2%	70,5%	74,0%	3,5
	Fond d'œil chez le diabétique **	65,8%	62,2%	66,9%	70,1%	69,7%	71,0%	1,2
	Dépistage maladie rénale chronique chez le diabétique **	41,0%	41,8%	43,2%	44,9%	44,2%	43,7%	-0,5
	<b>HTA</b>							
	Dépistage maladie rénale chronique chez l'hypertendu **	12,0%	12,3%	27,1%	28,0%	27,2%	27,8%	0,6
	<b>Risque cardio-vasculaire</b>							
	Prévention secondaire du risque cardio-vasculaire	38,5%	38,2%	38,9%	39,4%	39,7%	41,9%	2,2
	Surveillance d'un traitement par anti vitamine K **	63,1%	68,4%	74,8%	74,3%	74,1%	75,1%	1,0
	OPTIMISATION ET EFFICACITE DES PRESCRIPTIONS	<b>Prescription dans le répertoire (ou bio-similaires)</b>						
Statine dans le répertoire des génériques		92,5%	92,6%	98,2%	97,3%	95,7%	94,0%	-1,7
Antihypertenseur dans le répertoire des génériques		85,7%	87,7%	92,6%	95,1%	92,9%	94,6%	1,7
Traitement de l'incontinence urinaire dans le répertoire des génériques		44,4%	Indicateurs netralisés					
Traitement de l'asthme dans le répertoire des génériques		71,1%	Indicateurs netralisés					
Autres traitements dans le répertoire des génériques *		44,4%	62,1%	62,4%	65,2%	62,2%	61,4%	-0,7
Biosimilaires de l'insuline glargine ***		0,3%	2,6%	6,4%	14,2%	21,5%	27,2%	5,7
<b>Efficacité des prescriptions</b>								
Traitement par inhibiteurs de la pompe à protons				36,0%	35,7%	35,6%	37,0%	1,4
Traitement par ézétimibe				8,8%	9,9%	11,4%	13,6%	2,2
Traitement antiagrégant plaquettaire par aspirine		88,2%	89,0%	89,2%	89,5%	90,0%	90,5%	0,6
Traitement par metformine chez le diabétique de type 2	87,5%	87,5%	87,7%	87,9%	88,2%	87,5%	-0,7	
Hormonémies thyroïdiennes *	78,0%	80,2%	82,6%	84,6%	85,8%	86,0%	0,3	

Décroissants

Déc.

\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2017

\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2018

\*\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2019

\*\*\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2020